




PONTOS FORTES

- Tecnologia Conkesta Enlist;
- Elevado potencial produtivo;
- Excelente sanidade foliar;
- Bom aporte e arquitetura de plantas;
- Ampla adaptação geográfica.

CARACTERÍSTICAS	
Grupo de Maturação	8.1
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Altura de Planta (cm)	75 - 105 cm
Hipocótilo	Roxo
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hilo	Preto imperfeito
Início do Florescimento (DAE)	30 dias
Exigência a Fertilidade	Média/Alta
Peso de mil grãos (g)	170 - 190

Mapa das Regiões Edafoclimáticas



RESISTÊNCIA

DOENÇAS	S	MS	MR	R
Cancro da Haste				
Mancha Olho-de-rã				
Mancha Alvo				
Crestamento Bacteriano				
Pústula Bacteriana				

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível |
MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

RESISTÊNCIA

NEMATOIDE	S	MS	MR	R
Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6, 9, 10 e 14				
Galha				

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível |
MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

ÉPOCAS E REGIÃO RECOMENDADA		SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO				POPULAÇÃO	CICLO
REC	REGIÃO	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	Mil plantas finais/ha	Dias após a emergência
301	Sudoeste GO - Norte MS																	180 - 280	122 - 125
302	Sul GO																	180 - 280	120 - 123
302	Norte SP - Pontal Triângulo MG																	180 - 280	---
303	Triân. Mineiro - Alto Paranaíba - Sudeste GO																	180 - 280	---
304	Leste GO - Distrito Federal - Noroeste MG																	180 - 280	122 - 125
401	Centro - Oeste GO																	180 - 300	120 - 123
401	Sul MT - Sudeste MT																	200 - 320	120 - 123
402	Oeste MT - Sul RO																	200 - 320	111 - 115
402	Médio Norte MT																	200 - 320	111 - 115
403	Leste MT																	200 - 320	111 - 115
404	Norte GO - Sul TO																	200 - 320	120 - 123
405	Oeste BA Irrigado																	180 - 280	---
405	Oeste BA Sequeiro																	200 - 320	---
501	Norte TO, Sudeste PA, MA e PI																	200 - 320	---

■ Época tolerável ■ Época preferencial

*Nas áreas irrigadas, o plantio pode ser antecipado, acompanhando a data de liberação do vazio sanitário. Quando o plantio for realizado em áreas irrigadas, pode-se reduzir de 10 a 20% a população de plantas indicadas, a depender da fertilidade. Pode haver variação no ciclo devido as condições edafoclimáticas.