



PONTOS FORTES

- Flexibilidade de janela de plantio;
- Elevado potencial produtivo;
- Sistema radicular robusto e profundo;
- Excelente opção para 2ª safra de milho e algodão;
- Ampla adaptação geográfica.

CARACTERÍSTICAS


Grupo de Maturação	7.4 (GO) / 7.7 (MT)
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Altura de Planta (cm)	80 - 100 cm
Hipocótilo	Roxo
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Marrom Claro
Cor do Hilo	Preto
Início do Florescimento (DAP)	32 dias
Exigência a Fertilidade	Alta
Peso de mil grãos (g)	145 - 175

RESISTÊNCIA

DOENÇAS	S	MS	MR	R
Cancro da Haste				
Mancha Olho-de-rã				
Mancha Alvo				
Crestamento Bacteriano				
Pústula Bacteriana				

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível | MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

Mapa das Regiões Edafoclimáticas



NEMATOIDE	S	MS	MR	R
Cisto Raça 3				
Cisto Raça 14				
Galha				

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível | MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

ÉPOCAS E REGIÃO RECOMENDADA		SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO				POPULAÇÃO	CICLO
REC	REGIÃO	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	Mil plantas finais/ha	Dias após a emergência
203	Oeste de SP																	180 - 220	116 - 120
301	Sudoeste GO - Norte MS																	240 - 300	112 - 114
302	Sul GO																	240 - 300	108 - 112
302	Norte SP - Pontal Triângulo MG																	200 - 240	113 - 117
303	Triân. Mineiro - Alto Paranaíba - Sudeste GO																	200 - 260	112 - 118
304	Leste GO - Distrito Federal - Noroeste MG																	240 - 280	108 - 116
401	Centro - Oeste GO																	260 - 300	106 - 110
401	Sul MT - Sudeste MT																	260 - 320	111 - 114
402	Oeste MT - Sul RO																	260 - 320	103 - 108
402	Médio Norte MT																	260 - 320	103 - 108
403	Leste MT																	300 - 340	104 - 108
404	Norte GO - Sul TO																	240 - 280	106 - 110
405	Oeste BA Irrigado																	220 - 240	106 - 112
405	Oeste BA Sequeiro																	260 - 300	106 - 112
501	Norte TO, Sudeste PA, MA e PI																	260 - 320	100 - 104

■ Época tolerável ■ Época preferencial

*Nas áreas irrigadas, o plantio pode ser antecipado, acompanhando a data de liberação do vazio sanitário. Quando o plantio for realizado em áreas irrigadas, pode-se reduzir de 10 a 20% a população de plantas indicadas, a depender da fertilidade. Pode haver variação no ciclo devido as condições edafoclimáticas.