




PONTOS FORTES

- Tecnologia Intacta 2 Xtend;
- Elevado potencial produtivo;
- Elevado peso de grãos;
- Opção para manejo de nematóide de cisto raça 1.

CARACTERÍSTICAS	
Grupo de Maturação	7.7
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Altura de Planta (cm)	75 - 86 cm
Hipocótilo	Roxo
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hilo	Preto Imperfeito
Início do Florescimento (DAP)	35 dias
Exigência a Fertilidade	Média/Alta
Peso de mil grãos (g)	185 - 200

DOENÇAS	RESISTÊNCIA			
	S	MS	MR	R
Cancro da Haste				
Mancha Olho-de-rã				
Mancha Alvo				
Crestamento Bacteriano				
Pústula Bacteriana				

S = Suscetível | MS = Moderamente Suscetível |
MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente



Mapa das Regiões Edafoclimáticas

NEMATÓIDES	RESISTÊNCIA			
	S	MS	MR	R
Cisto Raça 1				
Cisto Raça 14+				
Galha - <i>M. Javanica</i>				

S = Suscetível | MS = Moderamente Suscetível |
MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

ÉPOCAS E REGIÃO RECOMENDADA		SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO				POPULAÇÃO	CICLO
REC	REGIÃO	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	Mil plantas finais/ha	Dias após a emergência
301	Sudoeste GO - Norte MS																	200 - 280	114 - 117
302	Sul GO																	200 - 280	112 - 115
302	Pontal Triângulo MG - Norte SP																	180 - 260	117 - 120
303	Triân. Mineiro - Alto Paranaíba - Sudeste GO																	180 - 260	116 - 121
304	Leste GO - Distrito Federal - Noroeste MG																	200 - 280	114 - 117
401	Centro - Oeste GO																	220 - 280	112 - 115
401	Sul MT - Sudeste MT																	240 - 320	115 - 121
402	Oeste MT - Sul RO																	240 - 320	103 - 104
402	Médio Norte MT																	240 - 320	103 - 104
403	Leste MT																	240 - 340	103 - 104
404	Norte GO																	220 - 300	112 - 115

■ Época tolerável ■ Época preferencial

*Nas áreas irrigadas, o plantio pode ser antecipado, acompanhando a data de liberação do vazio sanitário. Quando o plantio for realizado em áreas irrigadas, pode-se reduzir de 10 a 20% a população de plantas indicadas, a depender da fertilidade. Pode haver variação no ciclo devido as condições edafoclimáticas.