



PONTOS FORTES

- Permite abertura extrema de plantio (início de janela) em GO e MT;
- Elevado potencial produtivo;
- Excelente sanidade foliar e de raiz;
- Opção para solos arenosos na macrorregião sojícola 3;
- Ampla adaptação geográfica.

CARACTERÍSTICAS

Grupo de Maturação	7.8
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Altura de Planta (cm)	90 - 125 cm
Hipocótilo	Roxo
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hilo	Marrom Claro
Início do Florescimento (DAP)	38 dias
Exigência a Fertilidade	Média/Alta
Peso de mil grãos (g)	160 - 180

RESISTÊNCIA


DOENÇAS

S MS MR R

Cancro da Haste	■■■■■
Mancha Olho-de-rã	■■■■■
Mancha Alvo	■■■■■
Crestamento Bacteriano	■■■■■
Pústula Bacteriana	■■■■■

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível | MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

Mapa das Regiões Edafoclimáticas



RESISTÊNCIA

NEMATOIDES

S MS MR R

Cisto Raça 3	■■■■■
Galha	■■■■■

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível | MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

ÉPOCAS E REGIÃO RECOMENDADA		SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO				POPULAÇÃO	CICLO
REC	REGIÃO	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	Mil plantas finais/ha	Dias após a emergência
301	Sudoeste GO - Norte MS																	180 - 240	118 - 122
302	Sul GO																	180 - 240	115 - 117
302	Pontal Triângulo MG - Norte SP																	180 - 220	120 - 122
303	Triân. Mineiro - Alto Paranaíba - Sudeste GO																	180 - 220	118 - 124
304	Leste GO - Distrito Federal - Noroeste MG																	180 - 240	116 - 122
401	Centro - Oeste GO																	180 - 240	104 - 114
401	Sul MT - Sudeste MT																	200 - 240	110 - 114
402	Oeste MT - Sul RO																	200 - 240	103 - 110
402	Médio Norte MT																	200 - 240	100 - 104
403	Leste MT																	200 - 260	103 - 110
404	Norte GO - Sul TO																	200 - 280	104 - 114
405	Oeste BA Irrigado																	180 - 220	108 - 112
405	Oeste BA Sequeiro																	220 - 260	108 - 112
501	Norte TO, Sudeste PA, MA e PI.																	220 - 280	98 - 102

■ Época tolerável ■ Época preferencial

*Nas áreas irrigadas, o plantio pode ser antecipado, acompanhando a data de liberação do vazio sanitário. Quando o plantio for realizado em áreas irrigadas, pode-se reduzir de 10 a 20% a população de plantas indicadas, a depender da fertilidade. Pode haver variação no ciclo devido as condições edafoclimáticas.