



PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo com estabilidade;
- Bom comportamento em condições de estresse hídrico;
- Elevado potencial de engalhamento e peso de grãos;
- Ampla adaptação geográfica nas macrorregiões sojícolas 3, 4 e 5.

CARACTERÍSTICAS

Grupo de Maturação	7.9
Hábito de Crescimento	Semideterminado
Altura de Planta (cm)	80 - 90 cm
Hipocótilo	Roxo
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hilo	Preto Imperfeito
Início do Florescimento (DAP)	35 dias
Exigência a Fertilidade	Média
Peso de mil grãos (g)	180 - 190


RESISTÊNCIA

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da Haste				
Mancha Olho-de-rã				
Mancha Alvo				
Crestamento Bacteriano				
Pústula Bacteriana				

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível |
MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

Mapa das Regiões Edafoclimáticas



NEMATOIDES

Cisto	
Galha	

RESISTÊNCIA

	S	MS	MR	R
Cisto				
Galha				

S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível |
MR = Moderadamente Resistente | R = Resistente

ÉPOCAS E REGIÃO RECOMENDADA		SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO				POPULAÇÃO	CICLO
REC	REGIÃO	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	01	10	20	30	Mil plantas finais/ha	Dias após a emergência
301	Sudoeste GO - Norte MS																	180 - 220	120 - 124
302	Sul GO																	160 - 240	118 - 122
302	Norte SP - Pontal Triângulo MG																	160 - 220	123 - 127
303	Triân. Mineiro - Alto Paranaíba - Sudeste GO																	160 - 220	124 - 130
304	Leste GO - Distrito Federal - Noroeste MG																	180 - 220	120 - 124
401	Centro - Oeste GO																	200 - 240	110 - 115
401	Sul MT - Sudeste MT																	220 - 260	113 - 118
402	Oeste MT - Sul RO																	180 - 260	108 - 112
402	Médio Norte MT																	220 - 260	106 - 110
403	Leste MT																	200 - 260	108 - 112
404	Norte GO - Sul TO																	180 - 260	110 - 115
405	Oeste BA Irrigado																	160 - 220	115 - 119
405	Oeste BA Sequeiro																	200 - 240	115 - 119
501	Norte TO, Sudeste PA, MA e PI																	220 - 260	100 - 105

Época tolerável Época preferencial

• Nas áreas irrigadas, o plantio pode ser antecipado acompanhando a data de liberação do vazio sanitário. Pode haver variação no ciclo devido as condições edafoclimáticas